

Detección

Generado por IA — Nueva Escuela Mexicana Digital

Flashcards

PREGUNTA

¿Qué es un patrón anormal en el desarrollo?

RESPUESTA

Es una desviación o alteración en el desarrollo típico de un niño, como demoras en alcanzar hitos o comportamientos inusuales.

PREGUNTA

¿Qué se debe observar para detectar un retraso en el desarrollo?

RESPUESTA

Se debe observar qué conductas realiza el niño, cuáles no realiza y si hay comportamientos excesivos o inusuales, como rabietas frecuentes o baja tolerancia a la frustración.

PREGUNTA

¿Qué indica una demora en alcanzar hitos del desarrollo?

RESPUESTA

Puede ser un indicador de un retraso en el desarrollo o de un patrón anormal que requiere evaluación.

PREGUNTA

¿Cómo se relaciona la tolerancia a la frustración con el desarrollo?

RESPUESTA

Una baja tolerancia a la frustración, como rabietas constantes, puede ser un signo de alteraciones en el desarrollo.

PREGUNTA

¿Qué importancia tiene observar las conductas de un niño en diferentes contextos?

RESPUESTA

Permite identificar si las conductas son apropiadas para su edad o si hay patrones anormales que podrían indicar un retraso en el desarrollo.

PREGUNTA

¿Qué significa 'beringe' en el contexto del desarrollo infantil?

RESPUESTA

Se refiere a comportamientos como llantos o quejas excesivas, que pueden ser un signo de baja tolerancia a la frustración o alteraciones en el desarrollo.

PREGUNTA

¿Qué papel tienen los padres en la detección de alteraciones en el desarrollo?

RESPUESTA

Los padres son clave al observar y reportar conductas inusuales o demoras en los hitos del desarrollo de sus hijos.

PREGUNTA

¿Qué se debe hacer si se identifican patrones anormales en el desarrollo de un niño?

RESPUESTA

Es importante buscar una evaluación profesional para confirmar si hay un retraso o alteración en el desarrollo.

Resumen: Detección de Alteraciones en el Desarrollo Infantil

Nivel: secundaria

- La detección temprana se basa en observar patrones anormales en el desarrollo infantil, como retrasos en alcanzar hitos clave.
- Es importante identificar qué conductas realiza o no realiza el niño en comparación con el desarrollo típico.
- Alteraciones como rabietas frecuentes, baja tolerancia a la frustración o comportamientos inusuales pueden ser indicadores de un posible retraso o condición.
- Los padres y cuidadores juegan un papel crucial al observar y reportar estas conductas para facilitar un diagnóstico adecuado.
- Estas señales pueden estar asociadas a condiciones como retraso mental u otras alteraciones del desarrollo.

Mapa Conceptual

Detección

¿Cómo se detecta?

- Identificar patrones anormales en el desarrollo
- Observar retrasos o demoras en alcanzar hitos del desarrollo
- Analizar qué conductas realiza y cuáles no

¿Quién diagnostica?

Profesionales especializados en desarrollo infantil

Evaluaciones clínicas y observaciones

Patrones anormales

Desviaciones o alteraciones en el desarrollo

Conductas excesivas o ausentes

Rabietas frecuentes o intolerancia a la frustración

Ejemplos de conductas

Hacer berrinches excesivos

Tolerancia baja a la frustración

Conductas que no corresponden a la edad

Relación con retraso mental

Alteraciones más marcadas en niños con retraso mental

Mayor frecuencia de patrones anormales