

¿Existe un trastorno que permita tener una comorbilidad como un trastorno de conducta alimentaria?

Generado por IA — Nueva Escuela Mexicana Digital

Flashcards

PREGUNTA

¿Qué tipo de trastorno tiene mayor posibilidad de estar asociado a un trastorno de conducta alimentaria?

RESPUESTA

Los trastornos depresivos, especialmente en niños y adolescentes.

PREGUNTA

¿Qué trastorno alimentario está más relacionado con pacientes que tienen trastornos de ansiedad?

RESPUESTA

La anorexia.

PREGUNTA

¿Qué trastorno alimentario está más relacionado con pacientes que tienen TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad)?

RESPUESTA

La bulimia.

PREGUNTA

¿Qué factor común se encuentra en pacientes con trastornos de conducta y trastornos por uso de sustancias que desarrollan trastornos alimentarios?

RESPUESTA

La impulsividad.

PREGUNTA

¿Qué grupo de edad es más propenso a presentar comorbilidad entre trastornos depresivos y conductas alimentarias de riesgo?

RESPUESTA

Niños y adolescentes.

PREGUNTA

Menciona dos trastornos que pueden estar asociados a la bulimia.

RESPUESTA

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y trastornos de conducta.

PREGUNTA

¿Qué tipo de trastornos pueden estar relacionados con el uso de sustancias y trastornos alimentarios?

RESPUESTA

Trastornos por uso de sustancias, donde la impulsividad es un factor común.

PREGUNTA

¿Qué característica psicológica es común en pacientes con trastornos de conducta y trastornos alimentarios?

RESPUESTA

La impulsividad.

Resumen: Relación entre Trastornos de Conducta Alimentaria y Otras Condiciones Mentales

Nivel: secundaria

- Los trastornos depresivos en niños y adolescentes están asociados con un mayor riesgo de desarrollar conductas alimentarias de riesgo.
- La anorexia se observa con mayor frecuencia en pacientes con trastornos de ansiedad.
- La bulimia está relacionada con trastornos como el déficit de atención e hiperactividad, trastornos de conducta y el uso de sustancias.
- La impulsividad es un factor común en la comorbilidad entre trastornos alimentarios y otras condiciones mentales.

Mapa Conceptual

Comorbilidad con Trastornos de Conducta Alimentaria

Trastornos Depresivos

Mayor asociación con conductas alimentarias de riesgo

Ejemplo: Anorexia

Trastornos de Ansiedad

Asociación con anorexia

Impacto en patrones alimenticios

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)

Asociación con bulimia

Impulsividad como factor común

Trastornos de Conducta

Asociación con bulimia

Impulsividad como factor común

Trastornos por Uso de Sustancias

Asociación con bulimia

Impulsividad como factor común